



接种的疫苗原始剂量为辉瑞或莫德纳疫苗

对于免疫系统中度或严重削弱的个人，建议接种额外（第三）剂 mRNA 疫苗。

美国疾病控制与预防中心(CDC)建议，有中度至重度免疫功能受损且已接种mRNA疫苗（辉瑞或莫德纳疫苗）原始剂量的个人应接种第三剂疫苗。这包括满足以下任一条件的个人：

- 因肿瘤或血癌，正在接受相应的癌症治疗
- 接受了器官移植，且正在服用抑制免疫系统的药物
- 最近2年内接受过干细胞移植或正在服用抑制免疫系统的药物
- 中度或重度原发性免疫缺陷（例如狄乔治氏综合征(DiGeorge syndrome)或威斯科特-奥尔德里奇综合征(Wiskott-Aldrich syndrome)）
- 艾滋病毒感染晚期，或未治疗的艾滋病毒感染
- 正在使用大剂量皮质类固醇或其他可能抑制免疫反应的药物进行治疗

第三剂疫苗的品牌应与你接种的原始COVID-19疫苗系列相同。请咨询你的医生，询问是否需要额外接种一剂COVID-19疫苗，并询问根据你目前的治疗计划何时是最佳的接种时机。如果你正准备开始或重新开始接受免疫抑制治疗，这一点尤为重要。

在接种完额外（第三剂）疫苗的至少6个月 after，你可以考虑接种加强剂疫苗。该加强剂可以是任何一种COVID-19疫苗。

辉瑞——额外剂应该选择辉瑞疫苗



莫德纳——额外剂应该选择莫德纳疫苗



接种的疫苗原始剂量为强生疫苗

CDC建议，对于有中度至重度免疫功能受损，且已接种强生疫苗原始剂量的个人应接种加强剂疫苗。请咨询你的医生，询问根据你目前的治疗计划何时是最佳的接种时机。如果你正准备开始或重新开始免疫抑制治疗，这一点尤为重要。

